



TAMIZAJE NEONATAL

ANÁLISIS MUESTRA DE SANGRE

	RESULTADO	VALORES DE REFERENCIA	INTERPRETACIÓN
T.S.H Neonatal	2.81 µU/mL	>= 6 µU/mL talón en prematuros >= 10 µU/mL talón >= 15 µU/mL cordón	Normal
Deficiencia de Biotinidasa	185.0 U	<= 58 U	Normal
Fibrosis Quística	6.60 ng/mL	>= 60 ng/mL	Normal
Galactosa Total	0.70 mg/dL	>= 10 mg/dL	Normal
Hiperplasia Suprarrenal Congénita	8.30 nmol/L	>=250 nmol/L en RN <1500 g de peso >=180 nmol/L en RN entre 1500 g y 2499 g de peso >=80 nmol/L para RN con peso mayor a 2500 g	Normal
Deficiencia de G6PDH	6.40 U/gHb	< 2.6 U/gHb	Normal
Fenilcetonuria (PKU)	1.30 mg/dL	>= 2 mg/dL (120 µmol/l)	Normal

TÉCNICA: Fluoroimmunoensayo (Delfia).

Procesado en Colombia por PREGEN.

Hemoglobinopatías

FA

Ausencia de hemoglobinas anormales

Normal

TÉCNICA: Cromatografía Líquida de Alto Rendimiento (HPLC).

Procesado en Colombia por PREGEN.

RESULTADOS NORMALES

Recuerde que estas son pruebas de tamizaje que solo indican la probabilidad de que el recién nacido tenga una de las enfermedades estudiadas por el programa y pueden requerir pruebas adicionales para la confirmación de algún diagnóstico. La sensibilidad de estas pruebas se reduce a medida que aumenta la edad del paciente, por esto es conveniente realizarlas dentro del primer mes de nacido.

REVISADO :

EDUVILIA JOHANA GOMEZ

Bacterióloga

Reg.

40.936.003

PROCESADO :

MARIA JOSE PINZON GARCIA

Bacterióloga

Reg.

1.015.469.392

FECHA :

30/07/2026